



Žiadanka na laboratórne vyšetrenie

Tuberkulózne a netuberkulózne mykobaktérie

Oddelenie laboratórnej diagnostiky, NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
Tel.č.:052/4412 227, www.nudtarch.sk



Meno:	Kód poisťovne:
Priezvisko:	DG hlavná:
Rodné číslo:	DG pridružená:
ID hosp. prípadu:	Dátum odberu:
Zdrav. zariadenie a oddelenie:	
V prípade novorodenca:	Meno a priezvisko matky: Rodné číslo matky: ZP matky:

Materiál

<input type="checkbox"/> žalúdočný aspirát	<input type="checkbox"/> laryngeálny výter (3 ks)	<input type="checkbox"/> výpotok	<input type="checkbox"/> plná krv
<input type="checkbox"/> spútum	<input type="checkbox"/> uzlina	<input type="checkbox"/> punktát	<input type="checkbox"/> moč
<input type="checkbox"/> BAL	<input type="checkbox"/> ster rany	<input type="checkbox"/> likvor	<input type="checkbox"/> stolica
<input type="checkbox"/> výpotok	<input type="checkbox"/> tkanivo	<input type="checkbox"/> iné:	

Uskladnenie pred transportom: 2 - 8 °C 24 hod.
Preprava možná pri 20 °C do 3 hod. od odberu alebo uskladnenia

Vyšetrenia

<input type="checkbox"/> Náter a mikroskopia materiálu
<input type="checkbox"/> Mykobakteriologická kultivácia a citlivosť (kultivácia pri 37 °C a 32 °C)
<input type="checkbox"/> PCR vyšetrenie: Detekcia Mycobacterium tuberculosis komplex + netuberkulózne mykobaktérie <ul style="list-style-type: none">– U pozitivity TBC doplníme z vykultivovaného kmeňa detekciu mutácií, ktoré podmieňujú rezistenciu na izoniazid a rifampicín– U pozitivity netuberkulózných mykobaktérií určenie do druhov: M. avium, M. intracellulare, M. abscessus, M. massiliense, M. kansasii
<input type="checkbox"/> QuantiFERON-TB Gold Plus <ul style="list-style-type: none">– Odber aspoň 5 ml plnej krvi do skúmavky s Li-heparínom alebo odber do 4 šp. QuantiFERON skúmaviek

Kód zdravotníckeho zariadenia:	Pečiatka a podpis lekára:
Meno a kód indikujúceho lekára:	
Telefonický kontakt:	
Meno a kód <u>primára</u> oddelenia:	
Poznámky:	
Dátum:	

Odporúčenia k odberu a transportu:

- Čas od odberu vzorky po spracovanie v laboratóriu by nemal presiahnuť 7 dní (u žalúdočného aspirátu do 24 h).
- Žalúdočný aspirát je potrebné odoberať vždy nalačno. U vzoriek žalúdočného aspirátu je kvôli pôsobeniu žalúdočných kyselín potrebné bezodkladné doručenie do laboratória.
- S predlžujúcim sa časovým intervalom od odberu sa pravdepodobnosť úspešnej kultivácie znižuje.
- Pre PCR vyšetrenie nie sú vhodné výtery do uhlíkového transportného média - využite výterovky na drôte bez transportného média.

Prosíme Vás, aby ste sa pred transportom vzorky uistili, že je biologický materiál riadne uzatvorený vo vhodnej nádobe, zabalený do gázy alebo papierového obrúsku a vložený do sáčku. Žiadanku nikdy neprikladajte priamo k materiálu ale do separátneho sáčku.